Wiederholung: lineare Abbildungen

Def. Es seien $(V, +, \cdot)$ und $(U, +, \cdot)$ zwei Vektorräume. Eine Abbildung $f : V \rightarrow U$ heißt **linear**, falls für alle Vektoren $v_1, v_2 \in V$ und für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

(a) $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$,

(b) $f(\lambda v_1) = \lambda f(v_1)$.

Übung. Sei $f : V \rightarrow U$ linear. Dann gilt:

$$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2).$$

In der Tat,

$$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) \stackrel{(a)}{=} f(\lambda_1 v_1) + f(\lambda_2 v_2) \stackrel{(b)}{=} \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2).$$

Übung. Sei $f : V \rightarrow U$ linear. Dann gilt:

$$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3) = \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) + \lambda_3 f(v_3).$$

In der Tat, $f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3) \stackrel{(a)}{=} f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) + f(\lambda_3 v_3) \stackrel{(a)}{=} f(\lambda_1 v_1) + f(\lambda_2 v_2) + f(\lambda_3 v_3) \stackrel{(b)}{=} \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) + \lambda_3 f(v_3)$.

Analog. Es gilt: $f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n)$
(mehrmals das Trick anwenden)

Definition von Isomorphismus noch einmal

Def $(V, +, \cdot), (U, +, \cdot)$ seien Vektorräume. Eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow U$ heißt

<i>Monomorphismus</i>	<i>falls injektiv</i>
<i>Epimorphismus</i>	<i>falls surjektiv</i>
<i>Isomorphismus</i>	<i>falls bijektiv</i>
<i>Endomorphismus</i>	<i>falls $V = U$</i>

← heute benutzen

← heute besprochen

Die Vektorräume V und U heißen *isomorph*, falls ein Isomorphismus $f : V \rightarrow U$ existiert.

Logic des Abschnitts „Vektorraum“: synthetische Aufbau

- ▶ Definition — in Vorl. 2 gegeben — durch Eigenschaften (= „Axiomen“)
- ▶ Einige Eigenschaften, die man aus Axiomen durch logischen Schlussfolgerungen bekommt — alle Vorlesungen bis jetzt — und eine grosse Familie von Beispiele $\mathbb{R}^n$ – in Vorl. 3, 4 eingeführt
- ▶ Eine Aussage, dass alle Vektorräumen den Vektorräumen aus der Familie von Beispiele „gleich sind“

Frage: Was soll man hier unter „gleich sind“ verstehen?

Antwort: Isomorph.

Hauptsatz der linearen Algebra

Satz 11 (Hauptsatz der linearen Algebra) *Zwei endlichdimensionalen Vektorräume sind genau dann isomorph, wenn sie gleiche Dimension haben.*

Satz 11' (Hauptsatz der linearen Algebra) – einfachere Version
Jeder Vektorraum der Dimension n ist zu $\mathbb{R}^n$ isomorph.

Bemerkung. Die Sätze 11, 11' sind äquivalent. Die Richtung Satz 11 $\implies$ Satz 11' ist einfach: weil $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, ist nach Satz 11 ein Vektorraum der Dimension n zu $\mathbb{R}^n$ isomorph. Die (andere) Richtung „ $\impliedby$ “ ist ein bisschen aufwendiger; wir werden sie später beweisen.

Beweis $\implies$ (für Satz 11 und Satz 11')

Z.z.: Sind V und U Isomorph, so ist $\dim(U) = \dim(V)$. Sei $f : V \rightarrow U$ ein Isomorphismus. Sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis in V . Wir zeigen, dass die n -elementige Menge $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\} \subseteq U$ eine Basis in $\text{Bild}_f \subseteq U$ ist, d.h., es ist **linearunabhängig** und **erzeugend**.

Bemerkung. Da ein Isomorphismus nach der Definition injektiv ist, sind die Vektoren $f(v_1), \dots, f(v_n)$ verschieden; die Menge $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ ist deswegen tatsächlich n -elementig.

Linearunabhängigkeit: Sei $\lambda_1 \cdot f(v_1) + \dots + \lambda_n \cdot f(v_n) = \vec{0}$. Um Linearunabhängigkeit von $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ zu zeigen, **müssen wir zeigen, dass alle λ 's gleich 0 sind.**

Da f linear ist, ist $\lambda_1 \cdot f(v_1) + \dots + \lambda_n \cdot f(v_n) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n)$; also $f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \vec{0}$.

Da f ein Isomorphismus ist, ist f injektiv, deswegen ist

$\text{Kern}_f \stackrel{\text{Lemma 11}}{=} \{\vec{0}\}$, deswegen aus $f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \vec{0}$ folgt $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \vec{0}$ (weil $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \in \text{Kern}_f$ und $\text{Kern}_f = \{\vec{0}\}$ ist).

Da $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis ist, ist sie linearunabhängig. Dann aus $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \vec{0}$ folgt $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, was unseres Ziel war.

$\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ ist erzeugend:

Z.z.: jedes $u \in U$ kann man als Linearkombination von $f(v_1), \dots, f(v_n)$ bekommen.

Da die Abbildung f surjektiv ist, ist jeder Vektor von U das Bild eines Vektors aus V , also $\exists v \in V$ mit $f(v) = u$. Da $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis ist, kann man ein beliebiges Element von V als Linearkombination von $\{v_1, \dots, v_n\}$ bekommen, also $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ mit $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = v$.

Dann gilt:

$$u = f(v) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n).$$

Also, u ist tatsächlich Linearkombination von Elementen aus $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$, □

Da der Satz 11 (oder 11') sehr wichtig ist, werde ich separat die Sätze 11, 11' in der Richtung „ $\Leftarrow$ “ beweisen. Ich werde zuerst Satz 11' beweisen, d.h., ich werde zeigen, dass jeder $(V, +, \cdot)$ von Dimension n zu $\mathbb{R}^n$ isomorph ist.

Beweis von Satz 11' in der Richtung „ $\Leftarrow$ “. Wir müssen beweisen dass, jeder Vektorraum $(V, +, \cdot)$ der Dimension n zu $\mathbb{R}^n$ isomorph ist.

$(V, +, \cdot)$ sei n -Dimensional, sei $B = (v_1, \dots, v_n)$ ein Basis-Tupel in $(V, +, \cdot)$. Wir betrachten die Koordinatenabbildung

$C_B : V \rightarrow \mathbb{R}^n$. Nach Definition von Koordinatenabbildung gilt:

$C_B(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) := \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$. Wir zeigen, dass C_B ein Isomorphismus

ist, d.h., C_B **linear**, **injektiv** und **surjektiv** ist.

► **Linearität:** Lemma 10. (Sagt, dass die Koordinatenabbildung linear ist)

► **Injektivität:** Nach Lemma 11c genügt es zu zeigen, dass $\text{Kern}_{C_B} = \{\vec{0}\}$.

D.h., wir müssen zeigen, dass $C_B(v) = \vec{0} \implies v = \vec{0}$.

D.h., wir müssen zeigen, dass $0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_n = \vec{0}$, was offensichtlich ist.

► **Surjektivität:** Wir müssen zeigen, dass jedes

$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ Bild eines $v \in V$ ist. Aber $C_B(\lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_n \cdot v_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$.

Warum war Beweis so einfach? Weil wir Vorarbeit vorher gemacht haben.

Vor Beweis des Satzes 11 in „ $\Leftarrow$ “ Richtung brauchen wir Vorarbeit.
Vor dem Beweis: **Frage** $f : V \rightarrow \mathbb{R}^2$ sei eine lineare Abbildung. Für die Vektoren $v_1, v_2 \in V$ gelte: $f(v_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $f(v_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Was ist $f(v_1 + v_2)$?

Antwort.

$$f(v_1 + v_2) \stackrel{\text{Linearität}}{=} f(v_1) + f(v_2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Frage Was ist $f(2v_1 - 3v_2)$?

$$\begin{aligned} \text{Antwort. } f(2v_1 - 3v_2) &\stackrel{\text{Linearität}}{=} f(2v_1) + f((-3)v_2) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \\ &2f(v_1) - 3f(v_2) = 2 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Wir haben gesehen, dass (in den Beispiele oben) BILDE VON VEKTOREN BESTIMMEN DIE BILDE DEREN LINEARKOMBINATIONEN EINDEUTIG. Wir werden jetzt eine Verallgemeinerung dieser Aussage als Lemma formulieren und beweisen.

Lemma 15 $(V, +, \cdot)$ und $(U, +, \cdot)$ seien n -dimensionale Vektorräume, $(v_1, \dots, v_n)$ sei ein Basis-Tupel in V und $(u_1, \dots, u_n)$ sei ein n -Tupel der Vektoren aus U . Dann gilt: Es existiert genau eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow U$ so dass $f(v_i) = u_i$ für alle $i = 1, \dots, n$.

Bsp. Sei $V = U = \mathbb{R}^3$, als (v_1, v_2, v_3) nehmen wir die Standardbasis $\left(v_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, und als (u_1, u_2, u_3) nehmen wir $\left(u_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, u_2 := \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, u_3 := \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} \right)$.

Lass uns die Formel für die lineare Abbildung f , die $v_1 \mapsto u_1$, $v_2 \mapsto u_2$, $v_3 \mapsto u_3$, finden (ähnlich wie in Fragen-Antworten oben).

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= f \left(x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \\ &= f \left(x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + f \left(y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + f \left(z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = x \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 4x + 5y + 6z \\ 7x + 8y + 9z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Die Abbildung ist linear (Hausaufgabe 2d Blatt 4) und hat die Eigenschaft $f(v_i) = u_i$ ($i=1,2,3$).

Beweis von Lemma 15. Zuerst Existenz.

Wir werden diese Abbildung konstruieren, die Methode ist analog zu Fragen-Antworten oben und Bsp. nach Lemma 15. Sei $w \in V$. $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

seien Koordinaten von w in der Basis $(v_1, \dots, v_n)$, d.h.
 $w = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n = \sum_{i=1}^n x_i v_i$

Wir setzen

$$f(w) := x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n = \sum_{i=1}^n x_i u_i. \quad (\star)$$

Zu zeigen: (i) $f(v_i) = u_i$ und (ii) f ist linear.

Wir zeigen (i): Der Koordinatenvektor von v_i in der Basis $(v_1, \dots, v_n)$ ist

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i\text{-te Zeile}, \text{ weil } v_i = 0 \cdot v_1 + \dots + \underbrace{1 v_i}_{i\text{-te Stelle}} + \dots + 0 \cdot v_n, \text{ also}$$

$f(v_i) \stackrel{(\star)}{=} 0 \cdot u_1 + \dots + 1 \cdot u_i + \dots + 0 \cdot u_n = u_i$ wie behauptet.

Wir zeigen (ii): f ist linear

$w, u \in V$ habe Koordinaten $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ bzw. $\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$. Nach Lemma 10, die Koordinaten von $w + u$ sind $\begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$. Also,

$$f(w + u) \stackrel{\text{Lemma 10}}{=} f\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)v_i\right) \stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)u_i = \sum_{i=1}^n x_i u_i + \sum_{i=1}^n y_i u_i \stackrel{(*)}{=} f(w) + f(u).$$

Ähnlich, nach Lemma 10, die Koordinaten von λw sind $\begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$. Also,

$$f(\lambda w) = \sum_{i=1}^n \lambda x_i u_i = \lambda \sum_{i=1}^n x_i u_i = \lambda f(w).$$

Eindeutigkeit

Die Abbildung $\tilde{f} : V \rightarrow U$ erfülle die Voraussetzungen von Lemma 15, d.h., $\tilde{f}$ sei linear und $\tilde{f}(v_i) = u_i$ für $i = 1, \dots, n$. Wir müssen zeigen, dass $\forall w \in V \tilde{f}(w) = f(w)$, wobei f die oben in $(\star)$ konstruierte Abbildung ist.

$w \in V$ habe Koordinaten $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, d.h. $w = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$. Wir

haben

$$\begin{aligned} \tilde{f}(w) &= \tilde{f}(x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \tilde{f}(x_1 v_1) + \tilde{f}(x_2 v_2) + \dots + \\ &\tilde{f}(x_n v_n) \stackrel{\text{Linearität}}{=} x_1 \tilde{f}(v_1) + x_2 \tilde{f}(v_2) + \dots + x_n \tilde{f}(v_n) \stackrel{\text{Voraussetz.}}{=} \\ &x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n \stackrel{\text{Def. von } f}{=} f(w) \end{aligned}$$

Beweis von Satz 11 in „ $\Leftarrow$ “ Richtung

Seien $(V, +, \cdot)$ und $(U, +, \cdot)$ n -dimensionale Vektorräume mit Basen jeweils $(v_1, \dots, v_n)$ und $(u_1, \dots, u_n)$. Das Ziel ist zu zeigen, dass es einen Isomorphismus $f : V \rightarrow U$ existiert; wir werden den Isomorphismus mit Hilfe von Lemma 15 konstruieren.

Nämlich, wir betrachten die lineare Abbildung $f : V \rightarrow U$ sodass $f(v_i) = u_i; i = 1, \dots, n$. Solche Abbildung existiert (und ist eindeutig) nach Lemma 15. Wir zeigen jetzt, dass f ein Isomorphismus ist; d.h.; wir zeigen dass f **injektiv** und **surjektiv** ist.

Injektivität: Angenommen, $f(v) = f(\tilde{v})$. Z.z.: $v = \tilde{v}$.

Die Vektoren v und $\tilde{v}$ habe jeweils die Koordinatenvektore

$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} \tilde{\lambda}_1 \\ \vdots \\ \tilde{\lambda}_n \end{pmatrix}$. Dann gilt

$$f(v) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n) \stackrel{\text{Konstr. von } f}{=} \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n,$$

also $f(v)$ hat den Koordinatenvektor $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ in der Basis $(u_1, \dots, u_n)$.

Analog gilt:

$$f(\tilde{v}) = f(\tilde{\lambda}_1 v_1 + \dots + \tilde{\lambda}_n v_n) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \tilde{\lambda}_1 f(v_1) + \dots + \tilde{\lambda}_n f(v_n) \stackrel{\text{Konstr. von } f}{=} \tilde{\lambda}_1 u_1 + \dots + \tilde{\lambda}_n u_n.$$

Also auch $f(\tilde{v})$ hat den Koordinatenvektor $\begin{pmatrix} \tilde{\lambda}_1 \\ \vdots \\ \tilde{\lambda}_n \end{pmatrix}$ in der Basis $(u_1, \dots, u_n)$.

Da nach Voraussetzungen $f(\tilde{v}) = f(v)$ ist, sind die Koordinatenvektoren

von $f(\tilde{v})$ und $f(v)$ auch gleich, also ist $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\lambda}_1 \\ \vdots \\ \tilde{\lambda}_n \end{pmatrix}$. Dann sind

$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \tilde{\lambda}_i v_i = \tilde{v}$. Die Abbildung f ist also injektiv.

Die Abbildung f ist surjektiv

Sei $u \in U$ ein beliebiger Vektor. Wir müssen zeigen, dass $\exists v \in V$ mit $f(v) = u$.

Der Vektor u habe den Koordinatenvektor $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ in der Basis

$(u_1, \dots, u_n)$, d.h., $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$. Wir setzen $v := \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \in V$.

Es gilt: $f(v) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n) \stackrel{\text{Konstr. von } f}{=} \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = u$.

Wir haben gesehen, dass ein beliebiger Vektor u das Bild eines Vektors $v \in V$ ist; Surjektivität von f ist damit bewiesen.

Also, die Abbildung $f : V \rightarrow U$ ist linear und surjektiv und injektiv, ist deswegen ein Isomorphismus. Die

bijektiv

Vektorräume V und U sind deswegen isomorph,

Bsp: geometrische Ebene ist isomorph zu $\mathbb{R}^2$

Wiederholung: Sei E eine Ebene, $O \in E$ und V die Menge $V := \{\text{gerichtete Strecken mit Anfangspunkt } O \text{ und Endpunkt auf } E\}$ mit „Vektoraddition“ als Addition und Streckung/Stauchung als Multiplikation.

Wir haben gezeigt, dass eine Basis von $(V, +, \cdot)$ aus zwei beliebigen Vektoren $u, v \in V$ besteht mit $u \neq \vec{0} \neq v$ und $\forall \lambda \in \mathbb{R} \lambda u \neq v$

Also ist V zu $\mathbb{R}^2$ isomorph nach Satz 11'.

Außerdem haben wir in Beweis von Satz 11 den Isomorphismus direkt konstruiert: $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow V$ bildet $\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ auf $\lambda \cdot u + \mu \cdot v$ ab.

Bemerkung. Die Abbildung f ist eigentlich die inverse Abbildung zur im Beweis von Satz 11' konstruierten Isomorphismus.

Geometrie ist das Studium von mathematischen Modellen des Raumes, der uns auf Grund der Anschauung vertraut ist.

Die Geometrie gehört zu den ältesten Wissenschaften überhaupt. Bemerkenswertes geometrisches Wissen finden wir bereits in den orientalischen Hochkulturen des 5.–3. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Praktische Probleme aus der Messkunde, der Baukunst, der Astronomie und der Navigation wurden abstrahiert und führten zu geometrischen Regeln. Mit Hilfe von Logic kann man aus diesen Regeln neue Aussagen bekommen, und anwenden.

Schematisch könnte man es wie folgt vorstellen:

Empirische Wissenschaft ----> Formal-logische Theorie

Empirische Wissenschaft	Formal-logische Theorie
Erfahrungswissenschaft wie die Physik	Keine Begründung durch Erfahrung, keine anschaulichen Argumente
Experimente, Beobachtungen Aussagen über die Natur	Formale Ableitung von Sätzen nach Regeln der Logik aus Axiomen (nicht weiter begründetes System von Grundtatsachen) Anschauung nur als <i>Hinweis</i> auf Beweisführungen
Deutung der Theorie in der Welt	Grundlage für Theorien der Physik
Schule Alltag Technik	Hochschulmathematik Vermittlung der Idee des Beweisens auch in der Schule (so genanntes lokales Ordnen)

Was haben wir bis jetzt gemacht?

Wir haben die Eigenschaften genommen, die in Physik öfter vorkommen und empirisch nachgewiesen wurde – die Eigenschaften I–VIII des Vektorraums.

Dann haben wir alle mögliche (endlichdimensionale) Vektorräumen geschrieben — Satz 11 — alle sind zu $\mathbb{R}^n$ isomorph.

In anderen Worten, wir haben vollständig die alle mögliche „mathematischen Modellen des Raumes“ verstanden, in welchen die Axiomen I – VIII erfüllt sind.

Außerdem kann man die mathematischen Methode, Ideen und Tricks aus Theorie von Vektorräumen auch in anderen Branchen der Mathematik, vor allen in Analysis benutzen – Sie werden es während des Studiums mehrmals sehen.

Def – Wiederholung Sei $f : V \rightarrow U$ eine lineare Abbildung. Das **Bild** von f ist die folgende Teilmenge von U :

Bild $_f$ = $\{u \in U \text{ so dass es gibt ein Element } v \in V \text{ mit } f(v) = u\}$.
(Andere Bezeichnung: $f(V)$ – wird in Analysis-Vorlesung verwendet)

Der **Kern** von f ist die folgende Teilmenge von V :

Kern $_f$ = $\{v \in V \text{ so dass } f(v) = \vec{0}\}$.

(Andere Bezeichnung: $f^{-1}(\vec{0})$; wird oft in Analysis verwendet. Man bemerke aber dass f^{-1} nicht die inverse Abbildung nach unseren Definitionen ist; außerdem ist f^{-1} keine Abbildung. Also $f^{-1}(\vec{0})$ ist nur die Bezeichnung.)

Bsp. Betrachte die Abbildung

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es gilt: $\text{Bild}_f = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} : \text{wobei } x, y \in \mathbb{R} \right\}$.

$\text{Kern}_f = \{\vec{0}\}$ (wird auf der nächsten Folie besprochen)

Satz 12 (1. Dimensionsformel) Sei $f : V \rightarrow U$ eine lineare Abbildung.
Dann gilt:

- (a) Bild_f ist ein Untervektorraum von U .
- (b) Kern_f ist ein Untervektorraum von V .
- (c) Ist V endlichdimensional, so gilt:
$$\dim(V) = \dim(\text{Bild}_f) + \dim(\text{Kern}_f).$$

Bsp. Betrachte die Linearabbildung aus der Bsp. oben

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt: $\text{Kern}_f = \{\vec{0}\}$, weil
 $f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; also $\dim(\text{Kern}_f) = 0$.

$\text{Bild}_f = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$ ist 2-dimensional (mit der Basis

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$); also ist die Dimensionsformel

$\underbrace{\dim(V)}_2 = \underbrace{\dim(\text{Bild}_f)}_2 + \underbrace{\dim(\text{Kern}_f)}_0$ in diesem Bsp. richtig.

Beweis (a) Bild_f ist ein Untervektorraum von U

Beweis (a): Seien $u_1, u_2 \in \text{Bild}_f$, d.h. $u_1 = f(v_1)$, $u_2 = f(v_2)$.
Dann gilt:

- ▶ $u_1 + u_2 = f(v_1) + f(v_2) \stackrel{\text{Linearität}}{=} f(v_1 + v_2) \in \text{Bild}_f$
- ▶ $\lambda u_1 = \lambda f(v_1) \stackrel{\text{Linearität}}{=} f(\lambda v_1) \in \text{Bild}_f$.

Beweis (b) Kern_f ist ein Untervektorraum von V

Beweis (b): Seien $v_1, v_2 \in \text{Kern}_f$, d.h. $f(v_1) = f(v_2) = \vec{0}$. Dann gilt:

- ▶ $f(v_1 + v_2) \stackrel{\text{Linearität}}{=} f(v_1) + f(v_2) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$, d.h. $v_1 + v_2 \in \text{Kern}_f$.
- ▶ $f(\lambda v_1) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \lambda f(v_1) = \lambda \vec{0} = \vec{0}$, d.h. $\lambda v_1 \in \text{Kern}_f$.

Konstruktion einer Basis in Bild_f

Kern_f ist ein Untervektorraum des endlichdimensionalen Vektorraums V und ist deswegen auch nach Folgerung (d) aus Satz 10 endlichdimensional. Sei $\{v_1, \dots, v_k\}$ eine Basis von Kern_f . Nach Folgerung (c) können wir die Basis $\{v_1, \dots, v_k\}$ bis zu einer Basis in V ergänzen: es gibt $v_{k+1}, \dots, v_n$ so dass $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis ist. Wir zeigen: $\{f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)\}$ ist eine Basis in U . Wir müssen zeigen, dass $\{f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)\}$ linearunabhängig und erzeugend ist.

Wir zeigen: $\{f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)\}$ ist erzeugend

Wir müssen zeigen, dass man jedes $u \in \text{Bild}_f$ als eine Linearkombination von Elementen $f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)$ darstellen kann. Offensichtlich, kann man jedes $u \in \text{Bild}_f$ als eine Linearkombination von Elementen $f(v_1), \dots, f(v_n)$ darstellen. In der Tat, jedes $u \in \text{Bild}_f$ ist Bild des irgentwelchen Vektors v Weil $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis ist $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$, also

$$u = f(v) = f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n).$$

Aber $f(v_1) = f(v_2) = \dots = f(v_k) = \vec{0}$, da $v_1, \dots, v_k \in \text{Kern}_f$. Dann $u = \lambda_{k+1} f(v_{k+1}) + \lambda_{k+2} f(v_{k+2}) + \dots + \lambda_n f(v_n)$. Also ist $\text{span}(\{f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)\}) = \text{Bild}_f$.

Wir zeigen: $\{f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)\}$ ist linear unabhängig

Angenommen ist die Linearkombination $\lambda_{k+1}f(v_{k+1}) + \dots + \lambda_n f(v_n) = \vec{0}$.

Z.z.: $\lambda_{k+1} = \lambda_{k+2} = \dots = \lambda_n = 0$.

Wir haben:

$$\underbrace{1\vec{0} + 1\vec{0} + \dots + 1\vec{0}}_{k \text{ mal}} + \lambda_{k+1}f(v_{k+1}) + \dots + \lambda_n f(v_n) = \vec{0}.$$

Da $f(v_1) = f(v_2) = \dots = f(v_k) = \vec{0}$,

$$1f(v_1) + 1f(v_2) + \dots + 1f(v_k) + \lambda_{k+1}f(v_{k+1}) + \dots + \lambda_n f(v_n) = \vec{0}.$$

Weil f linear ist,

$$f(1v_1 + 1v_2 + \dots + 1v_k + \lambda_{k+1}v_{k+1} + \dots + \lambda_nv_n) = \vec{0}.$$

Also, $1v_1 + 1v_2 + \dots + 1v_k + \lambda_{k+1}v_{k+1} + \dots + \lambda_nv_n \in \text{Kern}_f$. Dann ist er die Linearkombination von Elementen $v_1, \dots, v_k$ und deswegen (Satz 7(b))

$$\lambda_{k+1} = \lambda_{k+2} = \dots = \lambda_n = 0.$$

Also gilt: $\dim(\text{Bild}_f) = [\text{Anzahl von Elementen in } \{f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)\}] = n - k$. Dann gilt:

$$\underbrace{\dim(V)}_n = \underbrace{\dim(\text{Kern}_f)}_k + \underbrace{\dim(\text{Bild}_f)}_{n-k}$$

□

Anwendung 1. Dimensionsformel für Endomorphismen

Def. — Wied: **Endomorphismus** = lineare Abbildung $f : V \rightarrow V$ von Vektorraum V auf sich selbst.

Folgerung. Sei $f : V \rightarrow V$ ein Endomorphismus von endlichdimensionalen Vektorraum V . Dann gilt:

$$f \text{ ist surjektiv} \iff f \text{ ist injektiv.}$$

Bemerkung. In Hausaufgabe 1 Blatt 5 mussten Sie mehrere Beispiele konstruieren – Sie werden sehen, dass falls U und V verschiedene Dimensionen haben, ist die Aussage der Folgerung nicht richtig.

Idea des Beweises: wir spielen mit der 1. Dimensionsformel (Satz 12): es gilt:

$$\underbrace{\dim(V)}_n = \dim(\text{Bild}_f) + \dim(\text{Kern}_f)$$

Beweis (surjektiv) $\implies$ (injektiv).

Ist f surjektiv, so ist $\text{Bild}_f = V$. Wir haben

$$\begin{array}{rccccccc} \dim(V) & = & \dim(\text{Bild}_f) & + & \dim(\text{Kern}_f) & & \\ n & = & n & + & ? & & \end{array} .$$

Dann ist $\dim(\text{Kern}_f) = 0$, folglich $\text{Kern}_f = \{\vec{0}\}$. Nach Lemma 11c ist f injektiv.

Beweis (surjektiv) $\Leftarrow$ (injektiv).

Ist f injektiv, so ist $\text{Kern}_f = \{\vec{0}\}$. Dann ist $\dim(\text{Kern}_f) = 0$.

Wir haben

$$\begin{array}{rccccccc} \dim(V) & = & \dim(\text{Bild}_f) & + & \dim(\text{Kern}_f) & & \\ n & = & ? & + & 0 & & , \end{array}$$

folglich $\dim(\text{Bild}_f) = n$. Dann enthält eine Basis B in Bild_f $n = \dim(V)$ linear unabhängige Vektoren. Nach Folgerung (a) aus Satz 10 ist dann B eine Basis in V , deswegen

$$\text{Bild}_f = \text{span}(B) = V,$$